

Grille de correction du concours national de commentaire d'ordonnances 2008

Accueil, écoute, empathie 2 points

Dispensation de l'ordonnance :

Diamicron LM une seule prise le matin 1 point

Metformine

prise en fin de repas pour diminuer les effets secondaires 1 point

Hydratation pour éviter acidose lactique 1 point

Pas de prescription de produits de contraste iodés 2 points

Lisinopril

prévention de la néphropathie du diabétique 2 points

Pas de toux sèche 1 point

Pravastatine effets secondaires douleurs musculaires 2 points

Stilnox proposer un générique 1 point

Proposer une boîte de 7 comprimés 1 point

Suivi médical

encourager le patient à consulter régulièrement un cardiologue, un ophtalmologue, un
néphrologue, un pédicure 1 point

Hygiène et diététique

Activité sportive et régime pour le diabète et le cholestérol 1 point

Arrêt du tabagisme 2 points

Demande d'ibuprofène en conseil

Proposer paracétamol 1 point

Posologie du paracétamol 1 point

Rapport avec douleurs musculaires de la pravastatine (voir au dessus)

Accueil 2 points						
Diamicron 1 point						
Metformine Fin de repas 1 point						
Metformine Hydratation 1 point						
Metformine Pd contraste 2 points						
Lisinopril Néphropathie 2 points						
Lisinopril Toux sèche 1 point						
Pravastatine Effets II 2 points						
Stilnox Générique 1 point						
Stilnox Bte de 7 cpr 1 point						
Suivi médical 1 point						
Sport et régime 1 point						
Tabagisme 2 points						
Paracétamol en conseil 1 point						
Paracétamol posologie 1 point						
Total sur 20 points						