

<p align="center">Kardégic®</p> <p>Motivation du patient pour une meilleure observance. Ne pas le prendre à jeun. Modification du plan de prise</p>	2												
<p align="center">Délivrance</p> <p>Rappel IEC/toux sèche. 0,5 points Pas d'arrêt brutal des Bêta-bloquants 0,5 points Prise de l'atorvastatine le matin ou le soir 0,25 points Attention au jus de pamplemousse 0,25 points Mise en garde par rapport à la rhabdomyolyse 0,5 points</p>	2												
<p align="center">Efferalgan®</p> <p>L'étudiant approuve le paracétamol mais déconseille l'effervescence et fait un rappel des posologies maximales et du délai entre les prises</p>	2												
<p align="center">Cigarette électronique</p> <p>Ne doit pas la délivrer et l'étudiant doit bien argumenter le refus de vente</p>	2												
<p align="center">Test Fagerström</p> <p>Les résultats donnent une dépendance modérée d'où le choix soit de patchs 14 mg soit de gommes 2mg</p>	2												
<p align="center">Explication gommes</p> <p>Posologie, protocole de mastication, symptômes de surdosage et de sous dosage</p>	2												
<p align="center">Intervention Sécurité Sociale</p> <p>50 euros par an, prescription médicale séparée, et pas de tiers-payant</p>	2												

<p>Règles hygiéno-diététiques Alimentation équilibrée, sport</p>	2												
<p>Conclusion Faire payer le tensiomètre, les gommés et les Efferalgan®, Mise en sac et conseil</p> <p>« ne pas hésiter à revenir si vous voulez des explications sur le fonctionnement de l'auto tensiomètre.....»</p> <p>« ne pas hésiter à revenir si vous souhaitez faire le point sur votre sevrage tabagique.....»</p>	2												
<p>Impression générale Empathie et sourire. Clarté de l'élocution. Écoute. Ne coupe pas la parole. Attitude et gestuelle</p>	4												
<p>Total</p>	/ 30												